

POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití

ALTELA®

Pomocný prostředek na zastavení vývoje houbových a bakteriálních chorob révy, ovocných stromů, brambor, zeleniny a jahod

Název a množství účinné složky:	extrakt z produktu fermentace <i>Lactobacillus</i> sp. 42 g/l (4,2%) extrakt z juky 10 g/l (1%)
Název nebezpečné látky:	síran zinečnatý CAS 7733-02-3 síran manganatý CAS 10034-96-5
NEBEZPEČÍ	
H302	Zdraví škodlivý při požití
H318	Způsobuje vážné poškození očí
H411	Toxicí pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P301+P312	PŘI POŽITÍ: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejoby štít
P501	Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu
EUH401	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
SP1	Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod./ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
<p>Pomocný prostředek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, vodních organismů, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.</p> <p>Pomocný prostředek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.</p>	
Držitel povolení/ Osoba odpovědná za konečné balení a označení:	BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, 664 42 Modřice, tel: 545 218 156, www.biocont.cz
Evidenční číslo pomocného prostředku:	1797-0C
Číslo šarže/ datum výroby formulace:	Uvedeno na obalu
Doba použitelnosti:	2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +25 °C
Množství pomocného prostředku v obalu:	HDPE láhev 1 l HDPE kanystr 5 l, 10 l

Způsob působení: ALTELA® je kontaktní produkt, který zastavuje vývoj houbových a bakteriálních chorob. Obsahuje přírodní enzymy, polyketidy, neživé bakterie, rostlinné extrakty a některé stopové prvky jako je mangan a zinek. Jedná se o významné mikroprvky pro metabolismus révy vinné i dalších rostlin

Návod k použití:

1)plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1)k plodině 2)k ŠO 3) k OL	4)Poznámka k dávkování 5)Umístění 6)Určení sklizně
réva	zvýšení odolnosti rostlin	0,6-1 l/ha max. 4x za rok	AT	1) od 65 BBCH do 70 BBCH 2) houbové choroby	
réva	zvýšení odolnosti rostlin	1-2 l/ha max. 6x za rok	AT	1) od 71 BBCH 2) houbové choroby	
ovocné stromy	zvýšení odolnosti rostlin	1-2 l/ha	AT	1) od 60 BBCH 2) houbové choroby	
brambor	zvýšení odolnosti rostlin	1-2 l/ha	AT	1) od 35 BBCH 2) houbové choroby	
obilníny	zvýšení odolnosti rostlin	0,5-1,5 l/ha	AT	1) od 37 BBCH 2) houbové choroby	
zelenina	zvýšení odolnosti rostlin	1-2 l/ha	AT	1) od 35 BBCH 2) houbové choroby	5) pole, skleníky
jahodník	zvýšení odolnosti rostlin	1-2 l/ha	AT	1) od 70 BBCH 2) houbové choroby	5) pole, skleníky

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
brambor	400 – 600 l/ha	postřik, rosení	8x	7 – 10 dnů
jahodník, zelenina	300 – 800 l/ha	postřik, rosení	4x	7 – 10 dnů
obilníny	200 – 400 l/ha	postřik, rosení	4x	7 – 10 dnů
ovocné stromy	400 – 600 l/ha	postřik, rosení	6x za rok	7 – 10 dnů
réva	300 – 600 l/ha	postřik, rosení	10x za rok	7 – 10 dnů

Upřesnění použití:

Neaplikujte při vysokých teplotách a za poledního slunečního svitu. Dojde-li do 48 hod po aplikaci ke srázkám, doporučujeme ošetření opakovat.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí: nejsou stanovena

Další omezení:

Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte. Postřik provádějte jen za bezvětrí nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Aplikace do skleníku: Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty OOPP, které nelze prát. Při používání pomocného prostředku na ochranu rostlin nepoužívejte kontaktní čočky. Práce s pomocným prostředkem je zakázaná pro mladistvé zaměstnance, pokud není vykonávána pod soustavným odborným dozorem.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

<u>Ochrana dýchacích orgánů:</u>	není nutná
<u>Ochrana rukou:</u>	gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1
<u>Ochrana očí a obličeje:</u>	ochranné brýle nebo ochranný šít podle ČSN EN 166
<u>Ochrana těla:</u>	celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688.
<u>Dodatečná ochrana hlavy:</u>	není nutná
<u>Dodatečná ochrana nohou:</u>	pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347

Společný údaj k OOPP: Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je nutné urychleně vyměnit.

Informace o první pomoci: Všeobecné pokyny: Vždy při zasažení očí neředěným pomocným prostředkem nebo projeví-li se zdravotní potíže (palení očí, bolest, slzení, zaruďnutí, nevolnost apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

Nadýchaní aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, přejděte mimo ošetřovanou oblast.

Zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv, zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte

Zasažení očí: Vyplachujte oči cca 15 min při násilím široce rozevřených víček čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Rychlosť poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.

Náhodné pozití: ústa vypláchněte vodou, případně dejte vypít sklenici (1/4 l) vody, nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.**

Skladování: Altela® se uchovává v originálních obalech při pokojové teplotě, v suchých dobře větraných místnostech odděleně od skladovaných potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Při skladování za uvedených podmínek – teplota skladování +5 až +25 °C. Pomocný prostředek nesmí zmrznout.

Likvidace obalů a zbytků: Oplachovou kapalinu nebo zbytky postříkové jíchy se zředí 1:5 vodou a bezezbytku vystříkají na ošetřovanou plochu, nesmí být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Použité obaly se dále nepoužívají. Zbytky pomocného prostředku a použité obaly se likvidují předáním odpovědné osobě.

Další údaje a upřesnění:

Výrobce: Gaiago SAS, Za la Sortoire, 35560 Saint Rémy du Plain, Francie

Příprava aplikační kapaliny:

Odměřené množství pomocného prostředku se rozmiří v kbelíku s menším množstvím vody a pak se vlije do nádrže aplikáčního zařízení naplněné do třetiny vodou. Po důkladném rozmíchání se nádrž doplní na požadovaný objem. Aplikační kapalinu připravujte vždy jen v nezbytně nutném množství, nikoliv do zásoby.

Čistění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku:

Aplikační zařízení po ukončení práce opakovaně vypláchněte čistou vodou. V případě čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití.

Pomocný prostředek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, ne jejichž základem bylo uděleno povolení. Laboratorní rozboru přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznamit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

Upozornění:

Před použitím pomocného prostředku si přečtěte přiložené pokyny.

Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nebo distributora nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím pomocného prostředku výrobce ani distributor neručí.

**Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.**

BIOCONT LABORATORY – biologická ochrana rostlin